


《全国中草药汇编（卷三）》中关于青钱柳的记载





第3版 主编 王国强

# 全国中草药汇编 (卷三)



人民卫生出版社



## 2775. 青兔儿风

### Qing tu er feng

【别名】走马丹、罗汉草、血筋草、走马胎、白背血筋。

【来源】为菊科兔儿风属植物红脉兔儿风 *Ainsliaea rubinervis* Chang 的全草。

【形态特征】多年生草本，高20-60cm，被棕色毛茸。具短根状茎，须根多条，较长。叶数片基生，叶柄长3-11cm；叶片窄卵形至卵圆形，长3-10cm，宽2-5cm，先端钝尖，基部微心形，全缘或呈疏波状，下面苍白色，叶脉下凸，紫红色。秋季抽出花茎，头状花序多数，无梗，排列成稀疏的穗状，每个花序有小花3-4朵，为管状两性花；总苞筒状，苞片数列，披针形，外端内长，覆瓦状排列，先端5裂；雄蕊5个。瘦果倒披针形，扁平而有纵线条；冠毛羽毛状。花期6-7月，果期8-9月。(图2775)



图2775 红脉兔儿风

【生境与分布】生于中山区及低山区的悬崖陡壁或林边岩壁上。分布于四川等地。

【采收加工】四季可采，去杂质，切段，晒干。

【药理作用】对钩端螺旋体有抑制作用。

【性味归经】苦、辛，温。归肺、肝经。

【功能主治】祛风散寒，止咳，活血止痛。适用于风寒咳嗽、头痛，风湿疼痛，跌打损伤；外用治淋巴结核，毒蛇咬伤。

【用法用量】3-9g；或泡酒服。外用适量，干品研粉，鲜品捣烂敷患处。

【用药警戒与禁忌】孕妇及热证咳嗽忌用。

【常用处方】(1) 风寒咳嗽、哮喘：青兔儿风、紫苏、杏仁各9g，水煎服。(《万县中草药》)

(2) 跌打损伤肿痛：青兔儿风12g，接骨木15g，水苦英30g，水煎，兑酒少许内服。

(3) 毒蛇咬伤：青兔儿风、瓜子金各等量。研末，醋调敷患处。(2-3方出自《四川中药志》)

#### 参考文献

[1] 宗希明 谢书文 刘娟. 中国菊科药用植物化学成分及开发利用. 哈尔滨: 东北林业大学出版社, 1998: 89

## 2776. 青钱柳

### Qing qian liu

【别名】青钱李、甜茶树、山麻柳、山化树。

【来源】为胡桃科青钱柳属植物青钱柳 *Cyclocarya paliurus* (Batal.) Hjin. 的叶。

【形态特征】乔木，高10-30m；髓部薄片状。单数羽状复叶长约20cm；小叶7-9，革质，长5-14cm，宽2-6cm，上面有盾状腺体，下面网脉明显，有灰色细小鳞片及盾状腺体，两面、中、侧脉皆有短柔毛。花单性，雌雄同株；雄蕊萼花序长7-18cm，2-4条成一束集生在短总梗上；雄花苞片小且不明显，2小苞片与2-3花被片的形状无区别；雄蕊24-30枚；雌蕊萼花序单独顶生；雌花苞片与2小苞片合生并贴生于子房中部；花被片4，生于房上端。果序轴长25-30cm；果实有革质水平圆盘状翅，直径2.5-6cm，顶端有4枚宿存花被片及花柱。花期4-5月，果期7-9月。

【生境与分布】生于海拔500-2500m的山谷河岸或湿润的森林中。分布于陕西南部、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南等地。

【栽培要点】青钱柳大树喜光，幼苗幼树耐荫，喜生于温暖、湿润肥沃、排水良好的酸性红壤、黄红壤之上，适生于湿度较大的环境中。育苗移栽，播前用50-60℃温汤浸种，冷却后再浸泡于清水中5-7天，阴干后播种。圃地土层要求深厚、肥沃的微酸性沙质壤土或壤土。整地时要求进行土壤消毒，用硫酸亚铁8kg/亩，杀虫螟松2kg/亩。用菜枯饼80kg/亩，磷肥25kg/亩，厩肥2.53kg/亩作基肥。条播，行距25-30cm，播种沟深2cm，覆土厚约1.5cm，上铺稻草，亩播种量5kg。幼苗长至7-10cm时，进行间苗，株距13-17cm。造林地应选择山区山坡中下部及山谷溪涧，土层深厚、肥沃、湿润，海拔在400m以上的地方。林地造林前几个月全面进行清理，按行株距挖穴，穴的规格为60cm×60cm×50cm。敲碎土后，表土回穴。培育短周期工业原料林(取叶用)的行株距为2m×2m。

【采收加工】春、夏季采收，洗净，鲜用或干用。

【化学成分】含黄酮类成分：山奈酚、槲皮素-3,6,3',5'-四甲氧基-5,7,4'-三羟基黄酮醇、山奈酚-3-O-β-D-吡喃葡萄糖苷、山奈酚-7-O-α-L-鼠李糖、山奈酚-4'-甲醚-7-O-β-D-甘露糖苷、槲皮素-3-O-α-L-鼠李糖苷、异槲皮苷等；三萜类成分：甜茶树苷A、青钱柳苷I-III、青钱柳酸B、2α-羟基熊果酸、青钱柳酸A、齐墩果酸、熊果酸、青钱柳苷B、青钱柳苷C、紫椴苷A、紫椴苷B、β-香树脂醇、β-香树脂酮等；有机酸类成分：α-乳酸、β-乳酸、4-羟基-3-甲