



《中华本草》中关于青钱柳叶的记载



中华本草

国家中医药管理局
《中华本草》编委会

上海科学技术出版社



《中华本草》：青钱柳

叶

【拼音名】Qīng Qián Liǔ Yè

【来源】药材基源：为胡桃科植物青钱柳的叶。

拉丁植物动物矿物名：Cyclocarya paliurus (Batal.)Ilj
in.[Pterocarya paliurus Batal.;P.micropaliurus T soong]



采收和储藏：春、夏季采收，洗净，鲜用或干燥。

【原形态】落叶乔木，高10-30m。树皮厚，灰色，深纵裂。枝条黑褐色，具灰黄色皮孔；髓心薄片状；冬芽裸露，密生褐色鳞片。奇数羽状复叶，长15-30cm，小叶7-9(稀5-11)片；叶片革质，长椭圆状卵形至阔披针形，长5-14cm，宽2-6cm，先端急尖或渐尖，基部偏斜，边缘有锐锯齿，上面有盾状腺体，下面网状脉明显，有灰色细小的鳞片及盾状腺体。花单性，雌雄异株；雄蕊萼花序3条或稀2-4条成1束，长7-18cm，簇生于短花梗上，雄花苞片小不明显，2枚小苞片与2-3枚花被片形状相似，雄蕊20-30枚，有时仅12枚；雌蕊萼花序单独顶生，雌花7-10朵，雌花苞片与2小苞片贴生至子房中部，花被片4，生于子房上端，子房下位，花柱短，柱头2裂，裂片羽毛状。果序长20-30cm，坚果，扁球形，直径约7mm，在中部四周由苞片及小苞片形成革质圆盘状翅，先端有4枚宿存的花被片及花柱。花期4-5月，果期7-9月。

【生境分布】生态环境：生于海拔500-2500m的山谷河岸或湿润的森林中。